



团 体 标 准

T/JSYX X—2025

“苏州六月黄”河蟹池塘养殖技术规程

Technical regulations for culture of Suzhou Liuyuehuang Crab

(征求意见稿)

2025 - XX - XX 发布

2025 - XX - XX 实施

江苏省渔业协会 发布

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由苏州市水产技术推广站提出。

本文件由江苏省渔业协会归口。

本文件起草单位：苏州市水产技术推广站。

本文件主要起草人：金希哲、张茂友、诸葛燕、徐峥、顾建华、周晓东、陈文华、赵俊胜、丛恒、王庆春。

“苏州六月黄”河蟹池塘养殖技术规程

1 范围

本文件规定了“苏州六月黄”河蟹池塘养殖的环境条件、黄蟹养殖、黄蟹捕捞、产品追溯等技术要求。

本文件适用于“苏州六月黄”河蟹的池塘养殖。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 11607 渔业水质标准
- GB 13078 饲料卫生标准
- NY/T 5361 无公害农产品 淡水养殖产地环境质量
- NY 5071 无公害食品 渔用药物使用准则
- NY 5072 无公害食品 渔用配合饲料安全限量
- SC/T 1132 渔药使用规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

“苏州六月黄”河蟹 Crab of “Suzhou liuyuehuang”

在苏州市域范围内，经过规范养殖的，性腺未成熟的当年第三次脱壳后的中华绒螯蟹，一般在农历六月左右上市，具有壳薄、肉嫩、肝胰腺颜色金黄、形状饱满呈流脂型的特点。

4 环境条件

水源无污染，水量充沛，进排水方便，水质符合GB 11607的要求。

4.2 池塘条件

池塘环境条件符合NY/T 5361的要求，每10亩配备3kw微孔增氧设备1套，0.75kw水车式增氧机2台。

4.2 池塘土质

壤土或黏壤土。

4.3 池塘面积

10亩~20亩。

4.4 池塘坡比

1:2~1:3左右。

4.5 池塘深度

水位能保持1.2m以上。

5 黄蟹养殖

5.1 放养前准备

5.1.1 清整消毒

清除过多淤泥，池底淤泥不超过10cm，蟹苗放养前20d应对池塘暴晒5d~7d，每亩使用生石灰75kg~100kg或漂白粉25kg（含有效氯 $\geq 25\%$ ）全池泼洒，杀灭病菌，改善底质，清塘药物应符合SC/T 1132的规定。

5.1.2 围栏设施

池塘四周用钙塑板、铝板或亚克力板等建防逃设施，埋入土中15cm~20cm，高出地面40cm，两边泥土夯实，防止河蟹逃逸。

5.1.3 进水管理

消毒10d后，池塘进水10cm~20cm左右，进水口采用60目长型筛网过滤进水，防敌害、虫卵进入池塘。

5.1.4 栽种水草

可种植伊乐藻、苦草、轮叶黑藻，以东西向3m，南北向5m间隔插穴，每穴8株~10株，同时根据套养品种、池塘类型、分塘计划选择其他水草进行复合种养，养殖期间保持水草覆盖率稳定在40%左右。

5.2 苗种放养

5.2.1 培育水质

蟹种下塘前7d，施有机肥和微生物制剂肥水，水体透明度30cm~40cm。放苗前1d~3d，全天开启增氧机。

5.2.2 苗种来源

蟹种应来源于具有苗种生产相应资质的良种（繁育）场，建议选用通过国家审定的中华绒螯蟹新品种。

5.2.3 放养规格

规格在60只/kg~80只/kg左右，要求规格整齐、体质健壮、附肢完整、无病无伤、活动力强。

5.2.4 放养密度

一般亩放养量为1500只~2000只。

5.2.5 放养时间

放养一般于1月至2月进行，以晴天早上为宜。

5.3 饲养管理

5.3.1 饵料投喂

5.3.1.1 饲料

饲料为优质的河蟹专用配合饲料、新鲜小杂鱼、玉米等。

5.3.1.2 投饲

3月份开始投喂，配合饲料应符合 GB 13078 和 NY 5072 的规定，粗蛋白质水平在 40%以上，隔天投喂 1 次，4 月~5 月随着池塘水温的回升，河蟹的摄食量逐渐增加，视气温情况每天投喂 1 次~2 次，日投喂量为存塘蟹总重的 4%，并以 1h~2h 吃完为宜。

5.3.2 水质管理

5.3.2.1 水位控制

养殖期间视情况加注新水，春季水位控制在50cm~70cm，夏季水位控制在120cm及以上。

5.3.2.2 水质调节

保持水中溶氧量在5mg/L以上，养殖期间定期检测水体pH、溶解氧、氨氮、亚硝酸盐等指标，保持良好水质。

5.3.3 水草管理

根据水草长势及时刈割水草，确保水草不浮出水面，疏通水流通道，使水草呈块状分布，池塘水草覆盖率始终保持在40%左右，并让水草距离水面20cm左右，保持水草活力。

5.3.4 病害防控

坚持“预防为主”的原则，使用符合NY5071规定的药物。

5.3.5 脱壳期管理

脱壳期补充钙离子1次~2次，配合使用维生素C，促进钙的吸收、增强体质和抗应激反应能力。河蟹喜欢到水草上面或浅水处脱壳，可采用0.5mm直径尼龙丝间隔30cm拉成防鸟网，防止鸟类啄食蜕壳蟹。

6 黄蟹捕捞

6.1 捕捞时间

6月中旬起，根据河蟹脱壳情况开始捕捞，选择壳硬，达到 100g/只以上的黄蟹进行售卖，至 7 月初黄蟹捕捞结束。

6.2 捕捞方法

采用地笼网捕捞。

7 产品追溯

建立完整的“苏州六月黄”河蟹养殖生产记录、用药记录、销售记录，要求规范如实填写，且保存期限不低于2年，确保产品质量可追溯。